

Mes, día y año necesarios para la documentación de todas las vacunas.

VACUNA ²	Guardería (4-6 años)	1° -2° grado (6-7 años)	3°-5° grado (7-10 años)	6° grado (11-12 años)	7° grado (12-13 años)	8°-11° grado (13-16 años)	12° grado (17-18 años)
HEPATITIS B <ul style="list-style-type: none"> La serie NO debe completarse en menos de 4 meses. La serie debe completarse en los 9 meses siguientes de comenzar a ir a la escuela. 	<p style="text-align: center;">3 dosis</p> <p style="text-align: center;">La 2ª dosis puede administrarse 1-3 meses después de la 1ª dosis. La 3ª dosis debe administrarse a las 24 semanas de edad o después. La 3ª dosis debe administrarse al menos 2 meses después de la 2ª dosis. La 3ª dosis debe administrarse al menos 4 meses después de la 1ª dosis.</p>						<p style="text-align: center;">Recomendada, pero no obligatoria</p>
DTaP/DT/Td/Tdap <ul style="list-style-type: none"> Los niños mayores de 7 años no deben recibir la vacuna DTaP. Después de cumplir 7 años, los niños deben recibir la vacuna Td o Tdap. 	<p style="text-align: center;">4 dosis de la vacuna DTaP</p> <p>SI la última dosis se administra al cumplir 4 años o después.</p>	<p style="text-align: center;">3 dosis de la vacuna DTaP , DT o Td</p> <p>SI la última dosis se administra al cumplir 4 años o después.</p>		<p style="text-align: center;">3 dosis de la vacuna DTaP, DT o Td</p> <p>SI la última dosis se administra al cumplir 4 años o después Y</p> <p style="text-align: center;">1 dosis de la vacuna Tdap</p> <p>SI el estudiante tiene 11 años de edad y SI han pasado al menos 5 años desde la última dosis de la vacuna DTaP, DT o Td.</p>		<p style="text-align: center;">3 dosis de la vacuna DTaP, DT o Td</p> <p>SI la última dosis se administra al cumplir 4 años o después, la vacuna Tdap puede sustituir 1 de las 3 dosis.</p>	
POLIO (IPV o OPV) <ul style="list-style-type: none"> Los estudiantes de 18 años o más no están obligados a recibir la vacuna IPV o OPV. 	<p style="text-align: center;">4 dosis SI todas las dosis se han administrado antes de cumplir 4 años. 3 dosis SI la última dosis se administra al cumplir 4 años o después.</p>						
MMR <ul style="list-style-type: none"> Se acepta un análisis de sangre (valor) que muestre inmunidad contra el sarampión, las paperas y la rubéola. 	<p style="text-align: center;">2 dosis</p> <p style="text-align: center;">La 1ª dosis debe administrarse al cumplir el primer año de edad o después (aplica un periodo de gracia de 4 días). La 2ª dosis debe administrarse al menos 28 días después de la primera dosis (NO APLICA el periodo de gracia de 4 días).</p>						
VARICELA <ul style="list-style-type: none"> La varicela debe recibirse el mismo día que la vacuna MMR O al menos con un intervalo de 28 días (NO APLICA el periodo de 4 días de gracia). Se acepta un análisis de sangre (valor) que muestre inmunidad contra la varicela y/o la comprobación/diagnóstico de enfermedades del proveedor de atención médica. 	<p style="text-align: center;">2 dosis</p> <p>Deben administrarse al cumplir el primer año de edad o después (aplica un periodo de gracia de 4 días). Historial de enfermedades comunicado por los padres NO es aceptable.</p>	<p style="text-align: center;">1 dosis</p> <p>Debe administrarse al cumplir el primer año de edad o después (aplica un periodo de gracia de 4 días). Historial de enfermedades comunicado por los padres es aceptable.</p>	<p>Recomendada, pero no obligatoria</p>		<p style="text-align: center;">1 dosis</p> <p>Debe administrarse al cumplir el primer año de edad o después (aplica un periodo de gracia de 4 días). Historial de enfermedades comunicado por los padres es aceptable.</p>	<p>Recomendada, pero no obligatoria</p>	

¹ Para asistir a una escuela pública/privada o guardería autorizada en el estado de WA, cada niño(a) debe presentar un impreso del **Certificado del estado de inmunización** mostrando prueba de 1) inmunización total según el Programa recomendado de vacunación infantil 2007 (<http://www.doh.wa.gov/cfh/Immunize/schools/vaccine.htm>), 2) comienzo de un programa de vacunación, 3) exención médica (con la firma del proveedor de atención médica), **O** 4) exención personal o religiosa (con la firma del padre/madre/tutor legal).

² No hay un intervalo máximo entre dosis. Incluso si no se satisface el intervalo recomendado, no es necesario reiniciar la serie. Las dosis de la vacuna administradas ≤ 4 días antes de la edad o intervalo mínimo son válidas, salvo los intervalos entre las dosis de la vacuna MMR, las dosis de la vacuna contra la varicela y las dosis de MMR y varicela.